

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов

29 ИЮЛ 2011

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Нобилис Ма5+Clone 30 против инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни живой сухой
(Организация- разработчик: компания «Intervet International B.V.»/
«Интервет Интернешнл Б.В.», Нидерланды)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Нобилис Ма5+Clone 30 (Nobilis® Ма5+Clone30).

Международное непатентованное наименование: вакцина против инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни живая сухая.

2. Лекарственная форма: лиофилизированная таблетка для приготовления раствора (сухая масса). Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости СПФ-эмбрионов кур, инфицированных аттенуированными вирусами инфекционного бронхита кур (штамм «Ма5» серотипа Массачусетс) и ньюкаслской болезни (штамм «Clone30») с добавлением стабилизаторов: d-сорбитола (66,6 мг), гидролизованного желатина (33,3 мг), панкреатического гидролизата казеина (33,3 мг), а также гидрофосфата натрия дигидрата (0,167 мг).

По запросу потребителя вакцина для интраназального (окулярного) метода введения комплектуется специальным растворителем «Окуло/Назал». В состав растворителя входят: калий гидрофосфат (0,37 мг), натрий гидрофосфат дигидрат (0,72 мг), натрий хлорид (7,65 мг), динатрий эдетат (0,5 мг), индикатор Патент Блю V (E131) (0,17 мг), вода для инъекций - до 1,0 см³.

По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу бледно-розового цвета, а растворитель - прозрачную жидкость синего цвета.

Вакцина расфасована по 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 или 10000 прививных доз в стеклянные флаконы, а растворитель – по 36,0 и 90,0 см³ в пластиковые флаконы соответствующей вместимости.

Флаконы с вакциной вакуумированы и герметично закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с растворителем герметично закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки с наличием гнезд и перегородок, обеспечивающих их неподвижность и целостность. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины на русском языке. Коробки с вакциной упакованы в ящики.

Флаконы с растворителем упакованы в коробки, куда вкладывают дозирующую пипетку-аппликатор и пластиковый переходник.

Срок годности вакцины составляет 24 мес, а растворителя – 48 мес с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина и растворитель к применению не пригодны.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8 °C, растворитель – от 15°C до 25 °C.

5. Вакцину и растворитель следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также вакцина, не использованная в течение 2 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут с последующей утилизацией.

Флаконы с растворителем без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей подлежат выбраковке с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины и растворителя не требуют соблюдения специальных мер предосторожности.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителям инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни через 5-7 суток после однократного применения, который сохраняется в течение 6 недель.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее $10^{3,0}$ ЭИД₅₀ вируса ИБК (штамм «Ma5» серотипа Массачусетс) и не менее $10^{6,0}$ ЭИД₅₀ вируса болезни Ньюкасла (штамм «Clone30»).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактики ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита у ремонтного молодняка, бройлеров и кур-несушек в племенных и товарных хозяйствах мясного и яичного направлений выращивания.

9. Запрещено прививать клинически больную и/или ослабленную птицу.

10. Вакцинации подлежат цыплята суточного возраста. Последующие сроки введения вакцины определяют в зависимости от эпизоотической ситуации в хозяйстве и уровня поствакцинальных антител. В эпизоотически неблагополучных по ньюкаслской болезни зонах птицу повторно иммунизируют Нобилис ND Clone 30 через 3-6 недель.

Вакцину вводят интраназально/окулярно и методом крупнодисперсного распыления (спрей-метод).

Интраназальный/окулярный метод

Перед применением вакцину растворяют из расчета 1000 прививных доз на 36,0 см³ растворителя Окуло/Назал (или 2500 прививных доз на 90,0 см³). Для этого флаконы с вакциной и растворителем соединяют при помощи прилагаемого пластикового переходника, объединяют и тщательно взбалтывают содержимое. При помощи дозирующей пипетки-аппликатора подготовленную вакцину в объеме ~0,03 см³ (1 капля) закапывают в носовую щель или наносят на конъюнктиву глаза. Голову цыпленка держат в горизонтальном положении в течение 1-2 секунд. При закапывании вакцины в носовую щель, другую ноздрю закрывают пальцем, благодаря чему достигается более глубокое проникновение препарата.

Для подготовки вакцины к применению разрешается использовать стерильный физиологический раствор. Для этого 1000 прививных доз вакцины растворяют в 50,0 см³ физиологического раствора и при помощи обычных (глазных) пипеток одну каплю (0,05 см³) закапывают в носовую щель или наносят на конъюнктиву глаза.

Метод крупнодисперсного распыления (спрей-метод)

Рабочий раствор вакцины готовят непосредственно перед применением, используя чистую питьевую воду, свободную от ионов хлора и железа. Вакцину растворяют из расчета: 1000 прививных доз в 0,125-0,250 л воды для иммунизации суточных цыплят и 1000 прививных доз в 0,5-1,0 л для иммунизации цыплят более старшего возраста.

Вакцинацию проводят при помощи специальных генераторов (распылителей) любой конструкции, создающих монодисперсные частицы диаметром 150-250 мкм. Распылители должны быть коррозионно-устойчивы, не содержать остатков дезинфектантов и использоваться только для вакцинации.

При вакцинации суточных цыплят их помещают в ящики, которые плотно устанавливают в один ряд и равномерно распыляют вакцину. Предпочтительно использовать специальные спрей-кабины (боксы), оборудованные стационарными распылителями.

Во время вакцинации птицы в птичниках необходимо отключить систему вентиляции и обогрева, закрыть вентиляционные отверстия, снизить уровень освещения. Вакцину распыляют над птицей на расстоянии 30-40 см.

Показателем правильно проведенной иммунизации является равномерно увлажненное оперение птиц.

Через 15 минут после вакцинации следует включить систему вентиляции и отопление, восстановить уровень освещения.

11. Симптомов проявления ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичной или повторной иммунизации не установлено.

13. Следует избегать нарушения рекомендованного срока проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур. В

случае пропуска введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией по применению побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

15. Запрещается совместное применение вакцины против ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур с другими иммунобиологическими препаратами.

16. Ограничения в использовании мяса и яиц от птицы, привитой вакциной Нобилис Ма5+Clone 30, отсутствуют.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом и переодеться. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия.

20. Организация-производитель: «Intervet International B.V.», Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция разработана фирмой ООО «Интервет» (143340, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Яковлевское, Россия) совместно с «Intervet International B.V» (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands).

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу «Инструкция по применению вакцины Нобилис Ма5+Clone30 против инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни, живой сухой», утверждённая заместителем руководителя Россельхознадзора 22.06.2009 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ ВГНКИ.