



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

15 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Нобилис RT inac против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной эмульгированной

(Организация-разработчик: компания Intervet International B.V./
"Интервет Интернейшнл Б.В.", Нидерланды)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Нобилис RT inac (Nobilis® RT inac).

Международное непатентованное наименование: вакцина против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная эмульгированная.

2. Лекарственная форма — эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости фибробластов СПФ-эмбрионов кур, инфицированной метапневмовирусом птиц (штамм BUT1 #8544), инактивированного β-пропиолактоном, с добавлением в качестве адьюванта легкого парафинового масла — 215 мг, эмульгаторов: полисорбата 80 — 8,8 мг, сорбитанаmonoолеата — 27,7 мг, буферного компонента: глицерина — 2,5 мг и воды для инъекций до 0,5 мл.

По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета. При хранении допускается расслоение эмульсии, однородность которой восстанавливается при взбалтывании.

Вакцина расфасована по 250 мл или 500 мл (500 или 1000 прививочных доз) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки, в каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины на русском языке.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 до 8 °C. Замораживание вакцины не допускается.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, подвергшиеся замораживанию, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, а также остатки вакцины, не использованные в

течение 3 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и **обеззараживанию путем кипячения в течение 20 минут**.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у кур и индеек к возбудителю метапневмовирусной инфекции птиц через 28 дней после однократного применения, который сохраняется в течение всего продуктивного периода птицы.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина Нобилис RT inac предназначена для профилактики метапневмовирусной инфекции птиц в племенных бройлерных и товарных птицеводческих хозяйствах яичного направления выращивания.

9. Запрещено прививать клинически больную и/или ослабленную птицу, а также кур и индеек позднее, чем за 4 недели до предполагаемого начала яйцекладки.

10. Вакцинации подлежат куры в возрасте 14-20 недель и индейки - в 28 недель.

Вакцину вводят однократно, в объеме 0,5 мл внутримышечно (в бедренную или грудную группу мышц) или подкожно в нижнюю треть шеи.

Перед применением вакцину выдерживают в течение 3-4 часов при температуре 15-25°C. Запрещается подогревание вакцины на водяной бане и на приборах отопления. Во время проведения вакцинации флакон с вакциной периодически встряхивают для восстановления однородности эмульсии.

Для вакцинации используют одноразовые стерильные шприцы и иглы, или многоразовые шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 минут. Место введения вакцины обрабатывают 70% спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

Для создания более напряженного иммунного ответа рекомендуется предварительно (за 4 недели до введения Нобилис RT inac) иммунизировать птицу живыми вакцинами против метапневмовирусной инфекции птиц.

11. Симптомов проявления метапневмовирусной инфекции птиц или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Вакцина не вызывает клинически выраженной поствакцинальной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости, самопроизвольно исчезающей через 1-2 недели.

13. Следует избегать нарушений сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики метапневмовирусной инфекции птиц.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

15. Не допускается смешивание вакцины Нобилис RT inac с другими вакцинами в одном шприце, за исключением Нобилис CAV P4.

16. Мясо, продукты убоя и яйцо, полученное от привитой птицы, реализуют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки, защитные очки закрытого типа, респираторы или марлевые повязки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством водопроводной воды. После работы с вакциной вымыть руки с мылом. При случайном введении вакцины человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция разработана компанией "Интервет Интернешнл Б.В." (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands) совместно с ООО "Интервет" (143345 Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, ул. Промышленная, д.81/1).

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Нобилис RT inac против инфекционного ринотрахеита кур, утвержденная Россельхознадзором 28.06.2006 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ "ВГНКИ".

Номер регистрационного удостоверения —