

**ИНСТРУКЦИЯ по применению  
комплекса дополнительного питания для птицы  
«БРОЙЛЕР АП»**

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- БРОЙЛЕР АП** – водорастворимый порошок, представляющий собой комплекс витаминов, минералов и аминокислот для птицы яичного и мясного направления, обогащенный селеном и марганцем.
- БРОЙЛЕР АП** содержит в 500 г готового продукта:

| № п/п | Наименование компонента           | Количество   |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1.    | Витамин А                         | 8 000 000 ИЕ |
| 2.    | Витамин D3                        | 2 600 000 ИЕ |
| 3.    | Витамин Е (токоферол)             | 6 000 ИЕ     |
| 4.    | Витамин В3 (пантотеновая кислота) | 5 500 мг     |
| 5.    | Витамин В1 (тиамин)               | 1 250 мг     |
| 6.    | Витамин В6 (пиридоксин)           | 2 000 мг     |
| 7.    | Витамин К (нафтохинон)            | 2 500 мг     |
| 8.    | Витамин В2 (рибофлавин)           | 3 000 мг     |
| 9.    | Витамин В12 (цианкобаламин)       | 10 000 мкг   |
| 10.   | Витамин Н (биотин)                | 62,5 мг      |
| 11.   | Витамин ВС (фолиевая кислота)     | 500 мг       |
| 12.   | Витамин В5 (никотинамид)          | 20 000 мг    |
| 13.   | Витамин С (аскорбиновая кислота)  | 25 000 мг    |
| 14.   | NaCl                              | 5 000 мг     |
| 15.   | Селен (selen)                     | 50 мг        |
| 16.   | Марганец (manganese)              | 15 000 мг    |
| 17.   | Аминокислоты, лактоза             | до 500 г     |

**БРОЙЛЕР АП** не содержит ГМО, консерванты, красители и адаптеры вкуса.

**II. ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

- БРОЙЛЕР АП** применяют птице в качестве комплекса дополнительного питания для повышения неспецифической резистентности организма, для профилактики и в составе комплексного лечения бактериальных, вирусных и паразитарных болезней; в качестве антистрессового средства (вакцинация, транспортировка, перевод в другое помещение и т.д.), в период смены рациона, повышения качества мяса бройлеров и куриных яиц, в период принудительной линьки, в качестве негормонального стимулятора роста и продуктивности, при заболеваниях печени и др.
- Препарат хорошо растворяется в воде и проходит через медикаторы.
- БРОЙЛЕР АП** применяют перорально с водой/кормом птице, начиная с суточного возраста, из расчета 500 г на 2000 л питьевой воды или 500 г на 1000 кг корма в течение 5-7 дней. При использовании препарата с питьевой водой рекомендуется 500 г продукта предварительно развести в 10 литрах теплой питьевой воды. Затем разведенный раствор вводят в 2000 литров воды для поения птицы.
- Использование яиц кур-несушек в пищу людям и убой птицы на мясо после применения **БРОЙЛЕР АП** разрешается без ограничений.
- Условия хранения: в сухом темном и недоступном для детей месте при комнатной температуре в течение 2 лет с даты изготовления.

**Форма выпуска:** алюминиевые саше 500 г..

**Организация-производитель:** THOROUGHbred REMEDIES MFG LTD, Ирландия.