

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора


Е.А. Непоклонов
« 7 » августа 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гепатовекса К для профилактики и лечения
жировой, токсической дистрофии печени, гиповитаминозов В₁₂ и В₄,
стрессов у свиней и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель фирма «SP Veterinaria S.A.» / «СП
Ветеринария С.А.», Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Гепатовекс К (Hepatovex K) лекарственное средство в форме раствора для орального применения для профилактики и лечения жировой, токсической дистрофии печени, гиповитаминозов В₁₂ и В₄, стрессов у свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. Гепатовекс К в 100 мл содержит в качестве действующих веществ :
L- карнитина гидрохлорид - 5 г, DL-метионина - 1,5 г, L- лизина моногидрохлорида - 1 г, холин хлорида - 5 г, витамина В₁₂ - 1 мг, манитола - 6,5 г, натрия хлорида - 10 г, калия хлорида - 7,5 г, сорбитола - 10 г, а также вспомогательные компонент: воду очищенную - до 100 мл.

3. По внешнему виду представляет собой представляет собой жидкость светло-красного цвета, ближе к розовому.

4. Выпускают в форме раствора для орального применения расфасованным по 5 л в полиэтиленовые канистры, укупоренные бутилкаучуковыми пробками, обкатанные алюминиевыми колпачками и упакованные по 4 штуки в картонные коробки.

Каждую канистру и коробку и маркируют с указанием на русском языке: наименования организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения, способа применения и количества лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ, номера серии, срока годности, даты выпуска, условий хранения, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят лекарственное средство в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

Срок годности при указанных условиях хранения - 2 года со дня изготовления.

Гепатовекс К не должен применяться по истечении срока годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Гепатовекс К способствует профилактике и лечению жировой и геморрагической дистрофии печени. Биологически активные вещества, входящие в состав лекарственного средства (витамины, аминокислоты, сахара, минеральные вещества), прекращают развитие патологических изменений, возникающих в результате кормления животных высококалорийными рационами, при контаминации кормов микотоксинами, при физиологическом напряжении на пике продуктивности, при стрессовых состояниях, после вакцинации, продолжительного лечения антибактериальными средствами, кокцидиостатиками или в случаях интоксикации.

3. Комплекс аминокислот и витаминов положительно воздействует на метаболические процессы, происходящие в организме. Холин хлорид - обеспечивает транспортировку жиров в жировые клетки, предупреждая накопление их в печени, так же уменьшает в ней содержание хлорорганических веществ и антибиотиков тетрациклиновой группы. Метионин способствует выведению жировых фракций из печени, участвует в метаболизме токсинов в печени и почках и как природный хелат, способен связывать тяжелые металлы. Сорбитол - липотропный фактор, стимулирующий метаболизм жирных кислот, секрецию желчных солей и пищеварительных ферментов. Витамин В₁₂ стимулирует гемопоэз в костном мозге, синтез нуклеиновых кислот, принимает участие в метаболизме жиров, в формировании миелиновой оболочки нервных волокон. Карнитин участвует в процессах окисления жирных кислот, осуществляя их транспорт через внутреннюю мембрану митохондрий и способствуя тем самым утилизации жира. Манитол и макроэлементы влияют на минеральный и углеводный обмен.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Гепатовекс К применяют для профилактики и лечения жировой, токсической дистрофии печени, гиповитаминозов В₁₂ и В₄, стрессов у свиней и сельскохозяйственной птицы.

8. Гепатовекс К применяют животным орально с водой для поения в следующих дозах:

птица: - 1 мл/л воды для поения в сутки в течение 5 дней.

свиньи: 1 мл/л воды для поения в сутки в течение 7-10 дней.

9. При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказаний не установлено.

10. Гепатовекс К совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками.

11. Продукцию от животных после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничения.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Гепатовексом К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

13. Гепатовекс К следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «СП Ветеринария СА» (Испания) совместно с ООО «Евровет сервис» (г. Москва).

(Организация-производитель: фирма «SP Veterinaria S.A»; STRA. REUS - VINYOLS KM. 4.1 43330 RYUDOMS (TARRAGONA), SPAIN).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-37/02195