

ГИДРО КОЛИСТИН

Оральный раствор

СОСТАВ: Колистин сульфат 200 000 000 I.U.
Растворитель до 100 мл

СВОЙСТВА: Колистин относится к группе полипептидных антибиотиков (полимиксинов), и обладает бактерицидной активностью в отношении Грам- флоры. Колистин нарушает проницаемость бактериальной стенки, что ведет к потере бактериальной клеткой питательных веществ, таких как аминокислоты, неорганические ионы и пиримидины. Это ведет к нарушению метаболизма и гибели микробной клетки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат предназначен для терапии инфекций ЖКТ, вызванных чувствительными к нему микроорганизмами, особенно киишечной палочки, также демонстрирует высокую активность и в отношении *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Птица: 0,5 мл/1 л воды, в течение 3-4 дней

КРС, МРС, свиньи: 1 мл/10 кг живой массы, в течение 3-4 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Побочные эффекты не описаны.

При совместном применении с миорелаксантами колистин может усиливать их действие, что увеличивает риск паралича дыхательной мускулатуры.

Не рекомендуется применять препарат совместно с препаратами кальция и магния, ненасыщенными жирными кислотами.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

При передозировке возможно возникновение быстропроходящих расстройств ЖКТ, обусловленных развитием дисбактериоза.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Убой свиней и птицы разрешен не ранее чем через 7 дней, КРС и МРС –через 14 дней после последнего введения препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте.

УПАКОВКА: 1л