



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Цефалекса 50 для лечения болезней бактериальной  
этиологии у свиней, телят, ягнят и сельскохозяйственных птиц

(организация-разработчик фирма «SP Veterinaria S.A.», Испания)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Цефалекс 50 (Cefalex 50).  
Международное непатентованное название: цефалексин.
2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.  
Цефалекс 50 в качестве действующего вещества в 1 г содержит: цефалексина - 500 мг, а в качестве вспомогательного компонента - моногидрат лактозы до 1 г. По внешнему виду препарат представляет собой белый порошок.
3. Цефалекс 50 выпускают расфасованным по 0,5 кг в пакеты из алюминиевой фольги, упакованные по 30 штук в картонные коробки.
4. Цефалекс 50 хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25 ° С.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения 2 года со дня производства.
5. Цефалекс 50 хранят в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства.**

7. Цефалексин - антибиотик первого поколения, группы цефалоспоринов. Механизм его действия основан на блокировании синтеза пептидов оболочки бактериальной клетки, что приводит к осмотическому дисбалансу и гибели растущей клетки. Обладает бактерицидным действием. Проявляет активность в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Clostridium* spp, *Corynebacterium* spp *Erysipelothrrix* spp; грамотрицательных микроорганизмов: *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp, *Escherichia Coli*, *Klebsiella* spp, *Proteus* spp.

Препарат устойчив в кислой среде, быстро и практически полностью (95%) абсорбируется в кишечнике. Распределяется во всех органах, тканях и

жидкостях. Выделяется с мочой в неизменном виде, небольшая часть выводится с желчью. Плохо проникает через гематоэнцефалический барьер. Цефалекс 50 по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает эмбриотоксическими, тератогенными и гепатотоксическими свойствами.

### III. Порядок применения

8. Цефалекс 50 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, некротическом энтерите и других заболеваниях, вызванных чувствительными к нему бактериями.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к цефалоспорину.

10. Цефалекс 50 применяют орально с водой для поения или с кормом, в дозе: сельскохозяйственной птице 0,2 – 0,4 г/л или 0,4 – 0,8 г/кг; свиньям, телятам и ягнятам – с водой для поения или молоком 0,15 – 0,3 г/л в течение 3-5 дней.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особеностей действия при первом приёме Цефалекс 50 и при его отмене не выявлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Цефалекс 50 в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фторхинолонам и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений) использование лекарственного средства прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

15. Запрещается применять Цефалекс 50 одновременно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, содержащими катионы магния, алюминия и кальция, которые, связываясь с ципрофлоксацином, препятствуют его абсорбции.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 дня, сельскохозяйственной птицы не ранее, чем через 2 дня после последнего применения Цефалекс 50. Мясо животных и птицы, вынужденно

убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Цефалекс 50 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Цефалекс 50. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые пакеты из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «SP Veterinaria S.A»; CTRA. REUS - VINYOLS KM. 4.1 43330 RIUDOMS (TARRAGONA), SPAIN.

Инструкция разработана «SP Veterinaria S.A»; CTRA. REUS - VINYOLS KM. 4.1 43330 RIUDOMS (TARRAGONA), SPAIN.

Регистрационный номер РК-ВП-4-1891-12